



# VAGINITE

GERMES	SIGNES CLINIQUES	MICROSCOPIE	TRAITEMENT
<p><b>Trichomonas vaginalis</b></p>	<p>Écoulement jaune-vertâtre Irritation vulvaire</p>	<p>Trichomonas mobiles</p>	<p>Metronidazole PO: 2g dose unique. Tinidazole PO: 2g dose unique (pas dans les femmes enceintes) <b>TRAITER LE PARTENAIRE</b></p>
<p><b>Vaginose (gardenella)</b></p>	<p>Écoulement gris-blanc Odeur poisson avarié</p> 	<p>Cellules cibles "Clue cells"</p>	<p>Traiter seulement si très symptomatique ou femme enceinte. Metronidazole PO: 2g dose unique ou Metronidazole 1 ovule/jour, 7 jours.</p>
<p><b>Candida</b></p>	<p>Prurit Écoulement blanc - crème (yaourt)</p>	<p>Levures et filaments mycéliens.</p>	<p>Clotrimazole 200mg/j pendant 3 jours ou Nystatine 100.000UI/j, 14 jours. Clotrimazole 500mg vaginal dose unique ou Fluconazol oral 150mg dose unique (rare à la pharmacie)</p>

# SUSPICION D'INFECTION GÉNITALE

Douleur hypogastrique +/- pertes vaginales



**Test grossesse!!!! Eliminer grossesse extra-utérine.**

**Tt ambulatoire :** Ceftriaxone 250mg IM dose unique + Doxycycline 100mg/12h (Grossesse: Erythromicine 1g / 12h) 14 jours + Metronidazol 500mg/12h PO 14 jours .

Rendez-vous pour Contrôle 72h après

**Tt hospitalisation :** Ceftriaxone 250mg IM /24h +Doxycycline 100mg/12h (Grossesse: Erythromicine 1g / 12h) + Metronidazol 500mg/12h PO o IV.

Le traitement dure au moins 2 jours après l'amélioration clinique et doit être suivi d'un traitement par Doxycycline PO 100mg/12h pendant 14 jours (Erythromycine chez la femme enceinte).

\*Hospitalisation: femme enceinte; diagnostique incertain; suspicion d'abcès pelvien, absence d'amélioration après 72h de traitement, VIH.

## Traitement cervicite (gonocoque + chlamydiae)

Ceftriaxone im 125mg ou Cefixime 400mg dose unique (on n'a pas à la pharmacie) + Azitromicina 1g dose unique ou Doxycycline 100mg/12h 14 jours

**Alternative:** Azitromizine 2g dose unique (non recommandé si problèmes digestifs)

Grossesse: Ceftriaxone im 125mg + Azitromicina 1g dose unique ou Erythromicine 1g/12h 7 jours (**pas de doxycycline pendant la grossesse!!!**)

**INVESTIGUER AUTRES INFECTIONS DE TRANSMISSION SEXUELLE (VIH, Syphilis..)**

\* Le partenaire présente un écoulement urétral  
La patiente elle-même présente 2 facteurs de risque parmi les suivants:

1. Age inférieur à 21 ans
2. Un nouveau partenaire
- 3 Plus d'un partenaire au cours des 3 derniers mois.

L'examen au speculum montre un écoulement de pus provenant du col de l'utérus